

SI HACER

¿Cómo actuar ante una **CRISIS DE EPILEPSIA?**

NO HACER

- | | |
|--|--|
| Conservar la calma | No abrirle la boca |
| Quitar los objetos cercanos para que no se lesione | No moverle |
| Dejar que se mueva o tiemble | No inmovilizarle |
| Colocar algo blando bajo su cabeza | No hacerle el boca a boca |
| Aflojar la ropa y complementos | No gritarle ni sacudirle |
| Ponerle de lado | No darle agua ni alimentos ni medicamentos |



112
061

Si dura más de 5 minutos, llamar a **EMERGENCIAS** y administrar **Stesolid rectal** en caso de disponer de él.



NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE STESOLID*

1. Rasar para calibrar correctamente la longitud (2,3 veces, sin tirar de ella) hasta encontrar la marca.
2. Colocar el supositorio hacia el lado contrario de la punta con un ángulo de 45 grados. No se debe introducir el supositorio en la punta (zona de inserción de la sonda) de la sonda para evitar la administración al error del mismo.
3. Insertar la sonda en el ano (20 centímetros de la línea navel) cuidadosamente hasta la profundidad de la sonda.
4. Mantener siempre el supositorio introducido y la sonda hacia abajo durante la administración.
5. Mantener el supositorio introducido en el recto. No se recomienda hacer que el niño se mueva.
6. Cuando el supositorio se funda totalmente, vaciarse mediante presión de los dedos sobre la sonda.
7. Retirar la sonda cuidadosamente (presionando al mismo tiempo) manteniendo la sonda del paciente apuntando siempre hacia el recto para evitar una posible perforación.
8. Limpieza inmediata de la sonda con agua y jabón o alcohol (70%) de la zona de inserción.

¿Cómo utilizar el STESOLID rectal

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para tratar las convulsiones febriles y epilépticas en niños mayores de 1 año

¿CUÁNDO LO USAMOS?

Cuando una persona epiléptica tiene indicado este tratamiento y se encuentra inconsciente y convulsionando

¿CÓMO PREPARARLO?

- Cualquier persona puede hacerlo.
- No tener temor al administrarlo.
- Seguir las normas para su correcta administración.

<https://www.youtube.com/watch?v=yZTEhISeoBA>


MODO DE CONSERVACIÓN

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No requiere condiciones especiales de conservación.
- Conservar en embalaje original para proteger de la luz.
- Utilizar tras prepararlo, no guardarlo para usar más tarde.



PRINCIPIO ACTIVO

El **MIDAZOLAM** pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como **BENZODIAZEPINAS**.



ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL



Insertar la punta de la jeringa entre la encía inferior y la mejilla. Liberar lentamente la solución premedicada suavemente el bulbo hasta que se vacía.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de las **CRISIS CONVULSIVAS** agudas y prolongadas en lactantes, niños y adolescentes (de 3 meses a <18 años).

POSOLÓGIA

Rango de EDAD:
3 a 6 meses (ambos hospitalario)
> 6 meses a < 1 año

*En lactantes de entre 3-6 meses de edad, el tratamiento se debe administrar en un hospital en el que se pueda monitorizar al paciente y que cuente con equipo de reanimación.



BUCCOLAM® 2.5 mg
Midazolam
DOSIS DE MIDAZOLAM 2.5 mg en 0.5 ml

Rango de EDAD:
1 año a < 5 años



BUCCOLAM® 5 mg
Midazolam
DOSIS DE MIDAZOLAM 5 mg en 1 ml

Rango de EDAD:
5 años a < 10 años




BUCCOLAM® 7.5 mg
Midazolam
DOSIS DE MIDAZOLAM 7.5 mg en 1.5 ml

Rango de EDAD:
10 años a < 18 años



BUCCOLAM® 10 mg
Midazolam
DOSIS DE MIDAZOLAM 10 mg en 2 ml

!
No se deben acoplar a la jeringa para uso oral:
Agujas, cánulas intravenosas o cualquier otro dispositivo para administración parenteral.
BUCCOLAM® no se debe administrar por vía intravenosa.



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LA FICHA TÉCNICA.



¿Qué es?

Es una reacción alérgica grave que ocurre rápidamente y puede llegar a ser mortal

Síntomas

Ronchas, bajada de tensión, falta de aire, mareos...

Causa

Alimentos, fármacos y picaduras de insectos



1

Solicitar ayuda médica al 112

2

Colocar a la persona en posición lateral y con las piernas elevadas o sentada si se encuentra más cómoda



¿CÓMO REACCIONAR?

3

Administrar adrenalina si cuenta con ella



JEXT

¿Cómo administro la ADRENALINA?

ALTELLUS



1



Agarrar el inyector con la mano dominante, con el pulgar al lado de la tapa amarilla



Quitar la tapa amarilla



Presionar el extremo energéticamente tras oír el clic durante 10 segundos (contar hasta 10)



Colocar la parte negra del inyector en la parte externa del muslo



5

Masajear la zona de inyección

Contiene una sola dosis y sirve para hacer frente a reacciones alérgicas repentinas que amenazan la vida.

Conservación

No refrigerar ni congelar, conservar a una temperatura no superior a 25°C.

Agarrar el inyector con la mano dominante, con el pulgar al lado de la tapa azul



1

Clave la inyección energéticamente en la parte externa del muslo



2

Tras oír el clic manténgalo apretado contra el muslo durante 3 segundos



3

Retirar, desechar y masajear la zona de inyección



4

¿QUÉ ES?

Significa "azúcar bajo en sangre" y tiene lugar cuando el nivel de azúcar en sangre es inferior a 70mg/dl.

Náuseas

Palidez

Irritabilidad y/o alteraciones de la conducta

Temblores

Hambre

SÍNTOMAS

Cada persona puede notarlo de forma diferente

Palpitaciones

Dolor de cabeza

Mareo y debilidad

Crisis convulsiva

Sudor frío

Confusión

Sin pérdida de conocimiento

- Ingerir 15gr de hidratos de rápida absorción
- Esperar 15 minutos
- Repetir control de glucemia
- Si sigue por debajo de 70, repetir estos pasos.

Con pérdida de conocimiento

- NO DAR LÍQUIDOS NI ALIMENTOS**
- Administrar glucagón
- Si no recupera consciencia, llamar al 112.

https://scrimdiagnosticon.portalsermis.org/hipoglucemia-como-actuar/

Cómo utilizar el GLUCAGÓN

¿CUÁNDO LO USAMOS?

Cuando una persona diabética se encuentra inconsciente con una glucemia inferior a 60mg/dl.

¿CÓMO PREPARA EL GLUCAGÓN INYECTABLE?

-Cualquier persona puede hacerlo. Introducir el agua de la jeringa en el vial de polvo, agitar, extraer contenido con jeringa e inyectar pegando un pellizco en la piel.

-No tener temor al administrarlo.

-Repetir inyección a los 10 minutos si la persona no recupera el conocimiento y no ha llegado el Servicio de Urgencias.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Aumenta los niveles de glucosa en sangre

Glucagón inyectable

MODO DE CONSERVACIÓN

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Conservar en nevera entre 2-8°C o fuera por debajo de 25°C.
- Conservar en embalaje original para proteger de la luz.
- Utilizar tras prepararlo, no guardarlo para usar más tarde.

https://cima.aemps.es/cima/doctm/p/59327/p_59327.html

VIBCO <https://www.youtube.com/watch?v=Gb0E0HPqHmw&t=144s>

¿CÓMO ADMINISTRAR EL GLUCAGÓN NASAL o Baqsimi?

1. Retire el precinto tirando de la banda roja.
2. Abra la tapa y saque el envase unidosis del tubo.
3. Sujete el envase entre los dedos y el pulgar.
4. Introduzca la punta en la fosa nasal hasta que el dedo toque el exterior de la nariz.
5. Presione el embolo hasta el fondo con el pulgar. La administración acaba cuando la línea verde ya no se ve.

-Cualquier persona puede hacerlo.

-No tener temor al administrarlo.

-Se administra como dosis única, por lo que contiene una sola dosis.

MODO DE CONSERVACIÓN

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No conservar a temperatura superior de 30°C.
- Conservar en embalaje original y sin abrir para proteger de la humedad
- Utilizar tras prepararlo, no guardarlo para usar más tarde.

https://cima.aemps.es/cima/doctm/p/1191406001/p_1191406001.html

VIBCO <https://www.youtube.com/watch?v=uTWKxAvovnc>